

VAŽNE INFORMACIJE ZA RODITELJE

Što su tablete sa kalijevim jodidom?

Kalijev jodid je medikament koji štitnu žlijezdu nakon nesreće kod radio-aktivnog zračenja djelotvorno štiti od raka štitne žlijezde. Austrija posjeduje za to najobuhvatniji koncept opskrbe na svijetu.

Ko bi se trebao opskrbiti tabletama kalijeva jodida?

Sve austrijske porodice sa djecom, trudnice, dojilje, odrasli do 40. godine trebali bi bezuvjetno **kod kuće biti opskrbljeni** tabletama.

Molimo Vas, Vašim pristankom potvrdite, da Vaše dijete **u školi ili dječjem vrtiću** može biti opskrbljeno prvom dnevnom dozom tableta kalijeva jodida.

Od čega štite ove tablete?

One posebno štite trudnice, dojilje, djecu i omladinu od raka štitne žlijezde nakon teške nesreće kod atomskog reaktora.

Kako se mogu dobiti tablete sa kalijevim jodidom?

U apoteci ili kod kućnih apoteka ljekara/ljekarki koji ih imaju u zalih:

- ♦ Za trudnice, dojilje, djecu i mlade do 18. godine tablete su besplatne.
- ♦ Za odrasle do 40. godine mogu se dobiti po cijeni od 1,70 €.

Zašto bi tablete sada trebalo zamijeniti, odnosno pribaviti?

Jer je dosadašnjim tabletama istekao rok upotrebe.

Nove tablete će imati rok upotrebe od 8 godina.

Kada treba uzimati tablete sa kalijevim jodidom?

Samo u slučaju kada službene vlasti preporuče uzimanje tableta sa kalijevim jodidom u slučaju radio-aktivne opasnosti. (Informacije preko radija i televizije.)

Ko treba koliko uzeti?

- ♦ Novorođenčad u prvom mjesecu života: jedanput ¼ tablete.

Dnevna doza za druge ciljne grupe:

- ♦ Dojenčad i mala djeca od drugog mjeseca do ispod 3 godine: ½ tablete
- ♦ Djeca od 3. do ispod 12. godina: 1 tabletu
- ♦ Mladi od 12. godine, trudnice, dojilje i odrasli do 40. godine: 2 tablete (Trudnice i dojilje smiju dobiti samo jednu dnevnu dozu.)

Službene vlasti obavještavaju putem radija i televizije kako dugo se moraju uzimati tablete.

Kako se uzimaju tablete sa kalijevim jodidom?

Tablete treba uzimati razmrvljene sa tečnošću, a najbolje uz malu uzinu.

Postoje li razlozi za neuzimanjem tableta?

Da, kod alergije na jod, alergije protiv drugih sastojaka, kod oboljenja štitne žlijezde i rijetkih kožnih oboljenja.

Raspitajte se o tome kod Vašeg kućnog ljekara/ljekarke ili u apoteci.

Mogu li tablete sa kalijevim jodidom imati popratna dejstva?

Da, a ta dejstva su većinom blaga i prema dosadašnjim iskustvima nastupaju dosta rijetko. Preporučuje se kod mogućih pitanja potražiti savjet kod Vašeg ljekara/ljekarke ili u apoteci.

Na što još treba obratiti pažnju u slučaju katastrofe?

Treba obratiti pažnju na informacije službenih vlasti preko radija i televizije; potražiti zaštitne prostorije; brzo poći kući; zatvoriti vrata i prozore; isključiti ventilacije; tuširati se i sl.

bm:bwk



Österreichische
Apothekerkammer

GDJE SE JOŠ MOGU DOBITI INFORMACIJE?

Savezno ministarstvo za socijalnu sigurnost i
generacije:

www.bmgfj.gv.at/Gesundheitsförderung

Savezno ministarstvo za unutrašnje poslove:

www.bmi.gv.at/zivilschutz

Savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i
kulturu:

www.bmbwk.gv.at

Austrijski savez za civilnu zaštitu:

www.zivilschutzverband.co.at

Magistrat grada Beča:

www.wien.gv.at/sirenen/sirenen/

Hotline Saveza za civilnu zaštitu:

0810/006306

Daljnje informacije kod:

give

**Servisno mjesto za zdravstveno
obrazovanje u ÖJRK-u**

Waaggasse 11
A-1040 Wien

tel. 01/58 900-372

faks 01/58 900-379

E-mail: give@redcross.or.at

<http://www.give.or.at>

PROFILAKSA SA TABLETAMA KALIJEVA JODIDA KOD NESREĆA SA RADIO-AKTIVNIM ZRAČENJEM

INFORMACIJA ZA RODITELJE

Personal za informacije kod GIVE

mr. Andrea Lehner
voditeljica

dr. Sonja Bauer
pedagoška saradnica

Gabriele Laaber
asistentica

give-hotline:
01/58 900-372

pon – sri 8.30-12.00 sati
čet 14.00-16.00 sati

© give – oktobar 2002.

give – Inicijativa Saveznog ministarstva
za obrazovanje, nauku i kulturu,
Saveznog ministarstva za socijalnu sigurnost
i generacije i
Austrijskog omladinskog crvenog križa

